



Grandes cultures

N° 13

Le 2 Octobre 1991

COLZA

Grosse Altise : Activité faible - A surveiller.
 Limaces : Vigilance.
 Pucerons : Le point.

COLZA

Stades levée (A) à 3 feuilles (B3)

GROSSE ALTISE

❖ Situation

- Captures en cuvette jaune : faibles. Localement une dizaine de captures cumulées depuis la levée (BORT-L'ETANG et MEZEL - 63).
- Morsures sur cotylédons : rares.

❖ Préconisation

Aucune intervention insecticide ne se justifie pour l'instant.

Maintenir une surveillance en cuvette jaune notamment après le stade 2 feuilles pour pouvoir intervenir dès que le cumul de 20 à 30 insectes est dépassé pour limiter les infestations larvaires.

LIMACES

Soyez très vigilant.

TENTHREDES

Quelques dégâts sont observés localement (Allier).

Intervenir avec un pyrèthrine (dose altise) dès l'observation des dégâts graves (feuillage dévoré par des larves de couleur grise à noire avec une bande longitudinale de chaque côté du corps; il ne reste que les nervures).

PUCERONS

Résultats des essais SPV de l'automne 90 :

- 5 essais exploitables sur les 7 implantés.

□ Modalités :

- Témoin
- 1 traitement raisonné au seuil (25 % de plantes colonisées)
- Traitements systématiques tous les 15 jours de A - B1 au stade 6 feuilles (B6).

□ Produit : KARATE K à 1,25 l/ha.

Suivi des pucerons :

Sur les 5 essais 3 présentent de fortes populations de pucerons comprises à B2 de 190 à 500 pucerons pour 100 plantes. L'espèce dominante : *Myzus persicae* (puceron vert).

□ Analyses virales :

→ BWYV (virus de la Jaunisse occidentale de la betterave). Présent partout de 96 à 100 % dans les témoins. Dans 2 essais sur les 3, le traitement au seuil ramène de 47 % à 59 % de plantes infestées.

→ TuMV (virus de la Mosaïque du Navet) Faiblement présent dans un essai.

→ CaMV (virus de la Mosaïque du chou-fleur) : non détecté - problème d'analyse.

. □ Symptômes observés :

Rien de net. Petite différence de hauteur entre témoin et traité.
(- 15 à - 20 cm) au stade G1 -G2.

□ Rendements Qx/ha

ESSAIS	Témoin	T. raisonné au seuil	T. systématique	Infestation Pucerons	Signif.
CHAMPAGNE 1	40,0	40,3	40,9	Faible	NS
CHAMPAGNE 2	47,5	45,4	47,6	Faible	NS
BASSE NORMANDIE	37,7	44,2 (+ 7,9)	43,4 (+ 6,4)	Forte	S
PICARDIE 1	42,6	45,1 (+ 2,5)	47,6 (+ 5)	Très forte	S
PICARDIE 2	24,9	32,0 (+ 7,1)	33,6 (+ 8,7)	Forte	S